REDSALUD
SOMOS CChC

REDSALUD EDUCA

# MORDEDURA **DE LA ARAÑA DE RINCÓN**

1 Su veneno es dermonecrótico y hemolítico, es decir, destruye la piel y los glóbulos rojos, pudiendo provocar la muerte.

2 La mordedura puede ser muy dolorosa (75% de los casos) o pasar inadvertida. De 2 a 24 horas de la picadura, comenzarán a aparecer los síntomas:

**Enrojecimiento de la piel (eritema) e inflamación (edema) que progresa a un halo vasoconstrictivo azul grisáceo extendido alrededor del sitio de la mordedura. Al centro presenta una coloración violácea.**

REDSALUD
SOMOS CChC

REDSALUD EDUCA

# ¿QUÉ HACER **ANTE SU MORDIDA?**



Poner hielo en la zona afectada en forma intermitente y según la tolerancia, no más de 15 minutos cada hora.

**El hielo ayuda a inactivar el veneno de la araña, que es más activo a altas temperaturas.**

REDSALUD
SOMOS CChC

REDSALUD EDUCA

# **ACUDIR** AL SERVICIO DE **URGENCIA SI HAY:**

1. Sospecha de mordedura por araña de rincón o si la víctima presenta lesión violácea en piel de rápida progresión o dolorosa.
2. Fiebre, náuseas, vómitos.
3. Dolor muscular, palidez o ictericia (piel amarilla).
4. Cambios de coloración en la orina.

5. Es importante, en lo posible, observar las características de la araña e idealmente capturarla y llevarla al servicio de urgencia.
6. Quienes tienen alergias serias a picaduras o mordeduras de insectos, deben llevar consigo un botiquín de emergencia con epinefrina (bajo receta médica), y sus amigos y familiares tienen que saber cómo manejarlo. Sin tratamiento, pueden ser mortales.

REDSALUD
SOMOS CChC

REDSALUD
EDUCA

# ¿CÓMO PREVENIR LAS MORDEDURAS?

Mantener un buen aseo en todo el hogar.

Separar las camas de las paredes.

No colgar ropas ni toallas en muros o puertas, y sacudirlas antes de usarlas.